



CAMPAÑA PRE SERVICIO

EN EL SERVICIO ES CUANDO SE DEFINE EL RESULTADO DE LA CRÍA BOVINA

La etapa de pre servicio implica tomar posición en distintos rubros en el campo, los cuales incidirán en desarrollo de un entore eficaz en términos de resultados de preñez.

Para todas las categorías se aplicará la vacunación con **AFTOSAN®** (aftosa), **BIO-CARBOGEN® 2** (antrax) y **RABIA PARESIANTE** (rabia).

RECOMENDACIONES SANITARIAS

Vaquillonas:

Las Vaquillonas, a esta altura, deberían haber recibido al menos tres dosis de **BIOABORTOGEN® H** más **BIOLEPTOGEN®**, controlado el tema de la tristeza y su aptitud reproductiva. La desparasitación interna (**PARAXANE® INYECTABLE**, **FOSFAMISOL® MV**, **BAGOMECTINA®**, **IVERGEN® PLATINUM 3,15**, **BAGOMECTINA® 3,15 LA AD3E**) con productos para ser utilizados según cada paso.

El diámetro pélvico, en casos de antecedentes de distocias, deberá ser tenido en cuenta así como la selección por peso según estándar racial y estado corporal.

Los antecedentes de recria y cría de la ternera sirven para saber con qué calidad de vientres contamos en esta categoría. Existe la posibilidad de contacto con los toros antes de la temporada, si sospechamos de esto, un tacto pre servicio está indicado para sacar preñeces por robo o animales con piómetras o abortos, producto de toros que se pasaron y estaban contaminados con algún agente que provoque estas consecuencias.

El control de garrapata *Boophilus microplus* también será monitoreado usando nuestros productos **CIPERSIN®**, **ASPERSIN®**, **BAGOMECTINA® 2,15 AD3E** e **IVERGEN® PLATINUM 3,15**.

El cobre y zinc deberán ser aplicados con **SUPLENUT®** cada 90 días.

Vacas primera parición con ternero al pie:

Esta categoría es interesante, porque el ternero está mamando y la vaca debe tener celo fértil. Cuanto antes destetemos, más rápido se recuperará para un celo fértil, además de mandarla a buen potrero antes del servicio.

Las vacunas **BIOABORTOGEN® H** y **BIOLEPTOGEN®** deberán ser dadas antes del servicio, si es la primera vez que se enfrentan a estas vacunas se aplicará dos dosis separadas por 30 días: 60 días y 30 días antes del servicio. Si ya fueron vacunadas el año pasado, aplicar una dosis de cada una 30 días antes del servicio.

El control de garrapata *Boophilus microplus* también ser monitoreado usando nuestros productos **CIPERSIN®**, **ASPERSIN®**, **BAGOMECTINA® 3,15 LA AD3E** e **IVERGEN® PLATINUM 3,15**. **SUPLENUT®** está indicado cada 90 días.

Vacas multíparas con cría:

Puede que haya quedado parte del rodeo con ternero al pie al momento del servicio en estaciones de monta largos. Aquí sugerimos analizar métodos como IATF, destete precoz o destete temporario para concentrar celos y disminuir la cola de vacas que mostrarán celo fértil tarde en la temporada de servicio.

El estado corporal está en relación directa con la prolongación de parto preñez. Seremos cautelosos en el manejo nutricional de esta categoría. El aporte de cobre y zinc con el producto **SUPLENUT®** será relevante para el desarrollo corporal y para la fabricación de defensas en el organismo.

El control de garrapata *Boophilus microplus* también será monitoreado usando nuestros productos **CIPERSIN®**, **ASPERSIN®**, **BAGOMECTINA® 3,15 LA AD3E** e **IVERGEN® PLATINUM 3,15**.

Vacas sin cría al pie y aptas para servicio:

Esperamos que esta categoría sea la de mejor estado corporal, su boca habrá sido revisada y si ya no tiene dientes debemos darle este servicio y declararlas CUT (Cría último ternero) e identificarlas, siempre y cuando soporten una parición más, sino esta vaca sin diente será ya destinada a engorde y venta para consumo.

Las demás vacas entran a servicio con el mismo plan **BIOABORTOGEN® H** más **BIOLEPTOGEN®**, **SUPLENUT®**, control de garrapatas y tristeza.

Toros:

Los toros deberán ser revisados andrológicamente, y diagnóstico de *Campylobacter spp* y *Trichomona foetus*, al menos tres raspajes separados por una semana.

Toros que fueron rinconeros en el servicio pasado, toros viejos o en mal estado al momento del servicio no deben ser incluidos.

Recordar que el semen se forma 60 días antes de ser eyaculado entonces la alimentación pre servicio es fundamental que sea buen y temprana.

Las vacunas serán **BIOABORTOGEN® H** más **BIOLEPTOGEN®** dos dosis separadas por 30 días. Control de garrapatas y desparasitación interna con: **PARAXANE® INYECTABLE**, **FOSFAMISOL® MV**, **BAGOMECTINA®**, **IVERGEN® PLATINUM 3,15**, **BAGOMECTINA® 3,15 LA AD3E**, **SUPLENUT®**.

Los toros son alocados a cada potrero y no aconsejamos rotarlos, tomar nota del número del toro y del potrero. La selección por biotipo, sumado a los antecedentes del comportamiento del toro del año pasado serán elementos a tener en cuenta. Si estuvieron en pastos secos o sobre maduros **BAGÓ® AD3E** será aplicada 60 a 90 días antes del servicio.

Estas sugerencias cumplen con el objetivo de orientar al profesional y al productor en el uso racional de los productos **Biogénesis Bagó**.

M. V. Enrique Guillermo Villar
Gerente Técnico Cono Sur
enrique.villar@biogenesisbago.com

