



	ENE	FEB	MAR	ABR	MA	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Observaciones
<b>INMUNIZACIÓN</b>													
<b>BIOPOLIGEN® HS / BIOPOLIGEN® AIR</b>			2º R	1º ds*	2º ds*				1º R				* En animales que no ingresan PRE ACONDICIONADOS
<b>BIOQUERATOGEN® OLEO MAX</b>			2º R	1º ds*	2º ds*				1º R				* En animales que no ingresan PRE ACONDICIONADOS
<b>TRIPLEpoligen / BIOCLOSTRIGEN® J5 / POLICLOSTRIGEN®</b>			2º R	1º ds*	2º ds*				1º R				* En animales que no ingresan PRE ACONDICIONADOS
<b>BIO-CARBOGEN 2</b>													
<b>BIOLEPTOGEN®</b>									1º R				En hembras destinadas a reproducción
<b>BIOABORTOGEN® H</b>				1º ds	2º ds								En hembras destinadas a reproducción
<b>CONTROL DE PARASITOS</b>													
<b>PARAXANE® INYECTABLE / FOSFAMISOL® MV</b>				1º ds*				3º ds*					* En rodeos con sospecha de resistencia a ivermectinas. Según Hpg
<b>BOVIFORT® / BAGOMECTINA® AD3E FORTE / BAGOMECTINA® 3,15 LA AD3E</b>						2º ds*		4º ds*					
<b>BAGOMECTINA®</b>											5º ds*		
<b>PARAXANE® INYECTABLE / FOSFAMISOL® MV</b>						2º ds*		4º ds*					En rodeos sin sospecha de resistencia a ivermectinas.
<b>BOVIFORT®</b>							3º ds*						
<b>BAGOMECTINA® / BAGOMECTINA® AD3E FORTE / BAGOMECTINA® 3,15 LA AD3E</b>				1º ds*							5º ds*		
<b>GALGOSANTEL® ORAL 15</b>													Para el control de <i>Fasciola hepatica</i> , según necesidad
<b>BIOFASIOLEX® T10</b>													
<b>ACIENDEL® PLUS / ARRASA®</b>													
<b>VITAMINAS Y MINERALES</b>													
<b>SUPLENUT®</b>													En zonas de Carencia de Cobre y Zinc
<b>ADAPTADOR® MIN Y ADAPTADOR® VIT</b>													