FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

GESTAVET® 600

Inducción y sincronización del estro. Tratamiento del anestro.
Gonadotrofina Coriónica (hCG) y Gonadotrofina Sérica (eCG) altamente purificadas, como polvo liofilizado y disolvente para su reconstitución.

Composición: en todos los casos, la concentración final tras la reconstitución completa es de 200 UI hCG + 400 UI eCG / 5 mL (equivalente a 1 dosis).
GESTAVET 600 monodosis (200/400): vial que contiene 200 UI de hCG + 400 UI de eCG/PMSG en forma de polvo liofilizado. Vial que contiene 5 mL de disolvente para reconstitución (agua para inyección).
GESTAVET 600 multidosis ("1000/2000 o "3000"): vial que contiene 1.000 UI de hCG + 2.000 UI de eCG/PMSG en forma de polvo liofilizado. Vial que contiene 25 mL de disolvente para reconstitución (agua para inyección).
Especies destino: cerdas.
Indicaciones: Inducción y sincronización del estro.
Vía de administración: Intramuscular, en el cuello por detrás de la base de la oreja.
Posología y recomendaciones de uso: 5 mL/animal, equivalente (200 hCG + 400 eCG). Administrar en dosis única al momento del destete o dentro de las 48 horas post destete.
El liofilizado debe reconstituirse utilizando todo el volumen del disolvente para GESTAVET.
GESTAVET 600 monodosis: diluir el liofilizado en su propio vial, utilizando todo el volumen de disolvente. Agitar para homogeneizar.
GESTAVET 600 multidosis: diluir el liofilizado utilizando un pequeño volumen de disolvente. Mezclar para homogeneizar. Agregue esta solución al vial que contiene el disolvente restante y mezcle para homogeneizar.

Biogénesis Bagó

GESTAVET® 600

Acción y propiedades farmacológicas: las gonadotrofinas (hCG y eCG/PMSG) son glicoproteínas complejas utilizadas para estimular el desarrollo y maduración de los folículos en el ovario. Mientras que la eCG/PMSG tiene afinidad por los receptores de FSH (favoreciendo la producción de estradiol y el comportamiento sexual) y LH (favoreciendo la maduración del folículo y estimulando la ovulación) en los folículos, la hCG sólo presenta afinidad por receptores LH. Debido a dichas razones, el producto induce y sincroniza eficazmente la primera ovulación post destete.
Sobredosis: dosis más elevadas del producto no generan reacciones adversas, pero tampoco proporcionan una mejor en la eficacia.
Tiempo de espera: 0 días.
Período de validez: 24 meses.
Conservación: en nevera entre 2 y 8 ºC. Mantener el vial liofilizado protegido de la luz solar.
Presentaciones comerciales: algunas presentaciones podrían no comercializarse en algunos países.
Formato múltiple/clínico: **GESTAVET 600** monodosis (200/400): 1 caja de cartón con 10 viales de 200 UI hCG + 400 UI eCG liofilizados + 1 caja de cartón con 10 viales x 5 mL de disolvente.
Formato múltiple/clínico: **GESTAVET 600** multidosis (“1000/2000” o “3000”): 1 caja de cartón con 10 viales de 1.000 UI hCG + 2.000 UI eCG liofilizados + 1 caja de cartón con 10 viales x 25 mL de disolvente.
Precauciones y advertencias: manipular con cuidado y bajo supervisión de un veterinario. Es muy recomendable el uso de guantes de látex. No se recomienda su manipulación por mujeres embarazadas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Medicamento exclusivo de uso veterinario.

Biogénesis Bagó

La evolución de la salud animal

Biogénesis Bagó

info.europe@biogenesisbago.com