



GESTAVET® OXI

Estimula las contracciones del útero y la bajada de la leche.

Solución inyectable lista para usar de Oxitocina (10 UI/mL).

Composición: vial que contiene Oxitocina sintética a una concentración de 10 UI por 1 mL.

Especies destino: bovinos, ovinos y cerdos (hembras, en todas las especies descritas).

Indicaciones: Vacas, cerdas y ovejas | **Parto:** inducción del parto (si el cuello uterino está completamente dilatado); involución uterina posparto y para ayudar a la expulsión de placenta retenida; Estimulación posparto de la bajada de la leche.

Cerdas | Lactancia: tratamiento de la agalactia posparto; inducción de la lactancia.

Vacas | Mastitis: terapia de apoyo (co-tratamiento) para facilitar el “vaciado” (ordeño completo) de los cuartos infectados en el tratamiento de la mastitis.

Vía de administración: intramuscular, subcutáneo o intravenoso.

Posología y recomendaciones de uso: parto: vacas 75 – 100 UI (equivalente a 7,5 – 10 ml), cerdas y ovejas 30 – 50 UI (equivalente a 3 – 5 ml). **Lactancia:** cerdas y ovejas 5 – 20 UI (equivalente a 0,5 – 2 ml).

Eyección (bajada) de leche y mastitis: vacas 10 – 20 UI (equivalente a 1 – 2 ml).

Acción y propiedades farmacológicas: la oxitocina (producida en el hipotálamo y liberada por la hipófisis posterior) estimula selectivamente la actividad motora del útero, aumentando las contracciones y el tono (cuando predominan los estrógenos: estro, proestro y etapa final de la gestación). También provoca la contracción de las células mioepiteliales de los acinos mamarios, lo que provoca la eyección de la leche (baja).

Sobredosis: puede producirse hiperestimulación y espasmo del miometrio, separación prematura de la placenta, bradicardias y arritmias e incluso la muerte de la madre y el feto. Pueden producirse hemorragias posparto, que serían tratadas sintomáticamente. Puede ocurrir muerte fetal.



GESTAVET® OXI



Tiempo de espera: Carne: 0 día (todas las especies) | Leche (vacas y ovejas): 0 horas; 0 días.

Período de validez: 24 meses. Una vez abierto, tiene un período de validez de 28 días.

Conservación: en nevera entre 2 y 8 °C, protegido de la luz solar.

Presentaciones comerciales: algunas presentaciones podrían no comercializarse en algunos países.

Caja individual: 1 caja de cartón con 1 vial x 100 mL.

Caja múltiple: 1 caja de cartón con 10 viales x 10 mL. 1 caja de cartón con 25 viales x 10 mL. 1 caja de cartón con 12 viales x 100 mL.

Precauciones y advertencias: manipular con cuidado y bajo supervisión de un veterinario. Es muy recomendable el uso de guantes de látex. No se recomienda su manipulación por mujeres embarazadas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Medicamento exclusivo de uso veterinario.

La evolución de la salud animal



**Biogénesis
Bagó**



info.europe@biogenesisbago.com