



OVISER® 500 OVISER® 5000



Inducción y sincronización del estro. Tratamiento del anestro.

Gonadotrofina Sérica altamente purificada (eCG), como polvo liofilizado y disolvente para su reconstitución.

Composición: en todos los casos, la concentración final tras la reconstitución completa es de 100 UI/ 1 mL.

OVISER 500: vial que contiene 500 UI de eCG-PMSG en forma de polvo liofilizado. Vial que contiene 5 mL de disolvente para reconstitución (PBS).

OVISER 5000: vial que contiene 5.000 UI de eCG-PMSG en forma de polvo liofilizado. Vial que contiene 50 mL de disolvente para reconstitución (PBS).

Especies destino: ovejas y cabras.

Indicaciones: Inducción y sincronización del estro. Inducción de la ovulación (tratamiento del anestro).

Vía de administración: Intramuscular.

Posología y recomendaciones de uso: 400 – 600 UI/animal, equivalente a 4 a 6 mL de la dilución final; dosis más frecuente = 500 UI (5 mL). **Época reproductiva:** 200 a 500 UI | **Época no reproductiva (anestro):** 400 a 500 UI.

Administrar en dosis única al finalizar el tratamiento con progestágenos (esponja o inserto de silicona). El liofilizado debe reconstituirse utilizando todo el volumen del disolvente para OVISER (5 o 50 mL de PBS). Para **OVISER 5.000:** diluir el liofilizado utilizando un pequeño volumen de disolvente. Mezclar para homogeneizar. Agregue esta solución al vial que contiene el disolvente restante y mezcle para homogeneizar. La concentración final es de 100 UI/mL.



OVISER® 500 OVISER® 5000



Acción y propiedades farmacológicas: eCG/PMSG es una glicoproteína compleja utilizada para estimular el desarrollo folicular en el ovario. Tiene afinidad por los receptores de FSH (favoreciendo la producción de estradiol y el comportamiento sexual) y LH (favoreciendo la maduración del folículo y estimulando la ovulación) en los folículos.

Sobredosis: Incluso después de administrar 5 veces la dosis recomendada (3.000 UI/animal) no hubo reacciones adversas.

Dosis elevadas de eCG/PMSG no proporcionan una mejor eficacia del producto. Además, podría tener un impacto negativo en el desempeño esperado.

Tiempo de espera: Carne: 0 días | Leche: 0 horas; 0 días.

Período de validez: 24 meses.

Conservación: en nevera entre 2 y 8 °C. Mantener el vial liofilizado protegido de la luz solar.

Presentaciones comerciales: algunas presentaciones podrían no comercializarse en algunos países. Formato unitario: **OVISER 5000:** 1 caja de cartón con 1 vial de 5.000 UI liofilizado + 1 caja de cartón con 1 vial x 50 mL de disolvente (PBS).

Formato múltiple/clínico: **OVISER 500:** 1 caja de cartón con 10 viales de 500 UI liofilizados + 1 caja de cartón con 10 viales x 5 mL de disolvente (PBS). **OVISER 5000:** 1 caja de cartón con 10 viales de 5.000 UI liofilizados + 1 caja de cartón con 10 viales x 50 mL de disolvente (PBS).

Precauciones y advertencias: manipular con cuidado y bajo supervisión de un veterinario. Es muy recomendable el uso de guantes de látex. No se recomienda su manipulación por mujeres embarazadas. Mantener fuera del alcance de los niños.

Medicamento exclusivo de uso veterinario.

La evolución de la salud animal



**Biogénesis
Bagó**



info.europe@biogenesisbago.com